

El corte de digestión, ¿un mito del verano?

Lo que coloquialmente conocemos como corte de digestión es, en realidad, el síndrome de hidrocución, provocado por un shock termodiferencial.

Canarias7 saludable

suplemento semanal

Enfermedad de Parkinson: diagnóstico y genética

En su colaboración semanal, el doctor René de Lamar aborda la importancia de la clave genética en la enfermedad de Parkinson.



CAMBIO DE PRÓTESIS

Cirugía mamaria secundaria

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. La primera causa de cirugía mamaria secundaria es el propio cambio de constitución del paciente operado hace tiempo, una modificación que tras 20 o 30 años puede ser importante, así como por el propio envejecimiento de las prótesis, asegura el doctor Javier de Elejabeitia González, especialista del Hospital Perpetuo Socorro



HPS
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO

UNIDAD DE CIRUGÍA
PLÁSTICA Y ESTÉTICA
www.hospitalperpetuosocorro.es

CIRUGÍA SECUNDARIA DE MAMA

cuando se desgasta una prótesis

Hospital Perpetuo Socorro. La cirugía secundaria mamaria es más delicada que la cirugía de aumento mamario normal y la experiencia del profesional juega un papel crucial, sobre todo si la cirugía se debe a una complicación de la primera, asegura el doctor Javier de Elejabeitia González, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora

Canarias7 Saludable
Las Palmas de Gran Canaria

La intervención de mama sigue a la cabeza de las operaciones más demandadas en cirugía plástica, estética y reparadora. A su vez, la primera causa de cirugía secundaria es el propio cambio de constitución del paciente operado hace tiempo. Una modificación que tras 20 o 30 años puede ser importante por las diferencias de peso, constitución, cambios hormonales, embarazo, volumen y tersura mamaria, así como por el propio envejecimiento de las prótesis.

Estos motivos provocan aproximadamente el 30% de las cirugías secundarias, siempre hablando de materiales de primera calidad, intervenciones realizadas por especialistas en el área homologados, y en centros sanitarios con todas las garantías. Lógicamente, desde que una de estas tres patas falle, el período de reintervención se reduce y el porcentaje de casos con deterioro aumenta, asegura el doctor Javier de Elejabeitia González, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de Hospital Perpetuo Socorro.

«Estos implantes, como cualquier otro dispositivo, pueden desgastarse o fallar. Es muy difícil saber la durabilidad de las prótesis, hoy en día con los nuevos materiales existentes se calcula que después de 25-30 años de su implantación, el 50% de ellos sufre un deterioro evidente», continúa el cirujano.

Por ello, este asunto, junto a los casos complicados, fue tratado en una mesa redonda, con la participación del doctor Elejabeitia como ponente, en el 52 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre) en el que, como cada dos años, se citan especialistas tanto españoles como del resto del mundo para tratar temas en los diferentes campos que abarca esta amplia especialidad.

Asimetrías, contractura capsular con alteración de forma y tacto mamario, alteraciones en la piel, cicatrices, caída mamaria, visualización evidente de bordes protésicos, alteraciones del surco submamario, rotura protésica e insatisfacción general con el resultado conforman las situaciones que generan una segunda operación de pecho.



C7

Intervención de mama. *Javier de Elejabeitia González Roca es doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.*

La cirugía secundaria mamaria es más delicada que la cirugía de aumento mamario normal y la experiencia del profesional juega un papel crucial, sobre todo si la cirugía se debe a una complicación de la primera. Al ser una zona ya intervenida, la anatomía y calidad de tejidos ya no es la misma, y no sólo se trata de una operación de aumento mamario, sino más bien de una cirugía de reconstrucción mamaria, teniendo que combinar varias técnicas quirúrgicas en el mismo acto.


En cualquier caso, la Unión Europea ha anunciado una nueva regulación con mayor vigilancia en torno a la calidad de los implantes, que además deberán ser supervisados por un grupo de expertos y sometidos a controles de varios organismos públicos.

Por ello, el doctor Elejabeitia resalta la continua investigación y vigilancia para asegurar la máxima calidad de estos dispositivos médicos implantables. «Los cirujanos plásticos valoramos muy positivamente estas nuevas medidas que equiparan los controles europeos a los que realiza la organización americana FDA. Estos controles ayudarán a evitar casos en el que los materiales no cumplan con las mínimas garantías de salud, como ocurrió hace unos años con las prótesis PIP de fabricación francesa, prótesis de bajo precio y que contenían un aditivo para carburantes», concluye el especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de Hospital Perpetuo Socorro.

Roturas protésicas

La rotura protésica es una de las principales preocupaciones de las pacientes. En este aspecto, hay que diferenciar entre rotura intracapsular, la más frecuente y que sólo afecta a la envoltura de la prótesis; y la extracapsular, que afecta también a la cápsula periprotésica cicatricial que forma el propio organismo. El porcentaje de rotura en las prótesis mamarias de última generación es muy bajo, en torno al 1%, debido tanto a los avances tecnológicos de los materiales como de las técnicas. Los implantes actuales de gel cohesivo tienen tres capas de seguridad rodeando al gel, por lo que es más difícil una rotura. Además, la cohesión del gel hace que éste permanezca dentro aún con la cubierta rota. Cuando un implante se rompe las situaciones son muy dispares, ya que muchas roturas son hallazgos casuales de revisiones ginecológicas rutinarias que, tras realizar la ecografía rutinaria se aprecia la rotura, estando la paciente totalmente asintomáticas. En otras ocasiones la paciente puede notar cambios en el tamaño, asimetrías, dolor, flacidez o alteraciones en la sensibilidad.

Aunque la posibilidad de ruptura es muy baja, las pacientes deben hacerse revisiones periódicas. Aparte de sus revisiones ginecológicas, las portadoras de prótesis mamarias se deben realizar una ecografía cada cinco años y, en caso de duda, una resonancia magnética, prueba más eficaz para evaluar las prótesis. Por supuesto, en caso de que todo sea normal, no hay ninguna indicación de tiempo que obligue al cambio protésico independientemente de los años que lleve implantada. Y precisamente para avanzar cada día en la calidad e innovación ofertada, se ha incorporado un sistema de valoración y visualización en tres dimensiones en el que la paciente podrá ver previamente cómo quedará su cirugía de implante mamario de forma muy realista.





Más donaciones

Día Nacional del Donante. España aumenta un 11,5% los trasplantes y un 10,2% las donaciones en lo que va de año

Canarias7 Saludable
Las Palmas de Gran Canaria

En lo que va de año España ha registrado un aumento de un 10,2% en el número de donantes y del 11,5% en la actividad trasplantadora, según ha informado este jueves la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. En concreto, el incremento en donación se ha producido gracias a la asistolia (27%) en todo el país. De hecho, 84 hospitales ya cuentan con programas que incluyen este tipo de donación, la cual se ha convertido en la vía de expansión más importante del número de órganos disponibles para trasplantes, junto con la colaboración de los médicos de Urgencias.

«Estamos ante un incremento excepcional», ha aseverado la directora general de la ONT, durante la presentación de los Juegos Mundiales de Trasplantados, que se celebrarán por primera vez en España el próximo 25 de junio.

Asimismo, los trasplantes que más han aumentado son los pulmonares (+25%), hepáticos (+17%) y los renales (+9,3%). «De seguir así, España podría superar los 5.000 trasplantes a finales de año, tres años antes de los objetivos que nos marcamos para 2020», ha asegurado Domínguez-Gil.

Respecto a la donación de médula ósea, la directora general de la ONT ha informado de que en lo que va de año se ha producido un aumento del 15 %, alcanzando los 323.857 donantes. «Es un enorme logro de la sociedad española y de todo el sistema», ha puntualizado.

ALCER. Por otro lado, la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) ha homenajeado, con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos, a todos los donantes anónimos que con su gesto altruista han permitido mejorar la calidad de vida de muchas personas a través de un trasplante. «Celebrar un día tan señalado omo el Día Nacional del Donante de Órganos es un motivo de gran satisfacción ya que la donación de órganos es el gesto más solidario que puede hacer una persona, sin esperar nada a cambio», ha comentado el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Alcer, Jesús Molinuevo.

Y es que, gracias a este gesto solidario, España ha alcanzado 43,8 donantes por millón de población, cifra que se traduce en 2018 donantes, a través de los cuales se han realizado un total de 4.818 trasplantes. Además, respecto a los trasplantes renales, la Organización Nacional de Trasplantes registró en 2016 «máximos» de actividad trasplantadora.

En este sentido, el presidente de la Federación Nacional Alcer ha recordado que año tras año y, gracias al modelo español dirigido por la ONT, se siguen batiendo records. No obstante, la organización ha avisado de que actualmente más de 5.000 personas se encuentran a la espera de recibir un trasplante que le permita mejorar su calidad de vida. Por ello, ha abogado por trabajar para lograr la protección social y laboral de las personas que deciden donar un órgano en vida.

189 casos anuales de melanoma en Canarias

El proyecto Euromelanoma alerta de que en Canarias se dan 189 nuevos casos anuales de melanoma. Aunque este no es el único tipo de cáncer de piel que se diagnostica en las Islas, ya que cada caso de melanoma hay 6 de carcinomas y 15 basocelulares, de ahí que sea importante la prevención y la concienciación.
Este proyecto permite a los pacientes que lo deseen realizarse pruebas gratuitas para descartar posibles alteraciones malignas o precancerosas en la piel, según informó en un comunicado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que presentó, junto a la Fundación Piel sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), una campaña de prevención ante las enfermedades de la piel que puede ocasionar la sobreexposición al sol, sobre todo ahora que empieza el verano.